

Памятка для населения.

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ КАРБУНКУЛ (ЭМКАР)

ЭМКАР, или иначе – эмфизематозный (шумящий, симптоматический) карбункул - острая инфекционная болезнь преимущественно крупного рогатого скота, требующая немедленной диагностики и лечения. Реже болеют козы и овцы.

Заболевание не является высококонтагиозным и не относится к разряду эндемичных. Характерными чертами считаются припухлости (карбункулы) и хромота. Преимущественное большинство заражённых в скором времени животных погибают.

Споры возбудителя способны заражать почву, растительность, навоз, заболоченные водоемы.

Заболевание животных ЭМКАР наблюдают круглогодично, но в интенсивности эпизоотического процесса отмечается четко выраженная летне-осенняя сезонность. Сено, заготовленное в заражённой местности, также может стать причиной заражения. Инкубационный период эмфизематозного карбункула составляет от 1 до 5 дней. Первые симптомы заметны в первые дни развития заболевания. В основном ЭМКАР имеет похожие признаки, однако выделяют несколько форм болезни.

Для острой формы характерно следующее течение.

- Температура повышается до 41—42 °С. В районе бёдер, грудины, шеи, других зонах с развитой мышечной массой, во рту или глотке появляются болезненные, плотные и горячие карбункулы (отёчные припухлости), которые при прощупывании издадут треск. Температура карбункулов падает. Увеличиваются лимфоузлы. При локализации на бёдрах проявляется хромота, проявление во рту или глотке затрагивает язык. Животное отказывается от корма, становится вялым, перестаёт жевать и начинает часто дышать. Учащается сердцебиение и нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Температура становится ниже нормы. Летальный исход наступает через несколько суток после заражения. Известны случаи длительного течения ЭМКАРа (до 10 дней).

Сверхострая форма случается реже, имеет более резкое проявление и не поддаётся диагностике. Основными признаками считаются: отсутствие карбункулов, быстрое протекание (до 12 часов спустя инфицирования), охват преимущественно телят, лихорадка, отсутствие аппетита, угнетённость.

При атипичной форме своевременное обращение к ветеринарным специалистам приводит к выздоровлению. Проявления болезни в данном случае минимальны, среди них: общее угнетённое состояние, болезненность мускулатуры, длительность от 1 до 5 суток.

Симптоматика некоторых форм эмфизематозного карбункула может быть скрытой или недостаточной для определения точного диагноза. По этой причине для диагностики заболевания одновременно прибегают к нескольким методам.

Владельцам животных необходимо обращать внимания на любые необычные проявления и изменения в поведении животного.

Важно! ЭМКАР можно не допустить, если следовать правилам профилактики болезни, в том числе своевременно предоставлять животных для профилактической вакцинации. Телят вакцинируют в возрасте 3 месяцев, затем в возрасте 6 месяцев и 1-го года. Далее животных вакцинируют 2 раза в год с интервалом 6 месяцев до достижения четырехлетнего возраста. Если же заражение произошло, необходимо своевременно обратиться к ветеринарным специалистам.

При возникновении ЭМКАР хозяйство карантинируют.

Важно! Комплекс мероприятий против эмфизематозного карбункула включает:

- профилактическую вакцинацию всего восприимчивого поголовья в неблагополучных по этой болезни пунктах и охрану животных от заражения;
- своевременную диагностику заболевания;
- карантинирование неблагополучных пунктов и ликвидацию эпизоотического очага;
- уничтожение трупов животных методом сжигания;
- дезинфекцию помещений, оборудования и зараженной территории.

В случае обнаружения симптомов незамедлительно обращаться по телефонам:

- ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба Иловлинского района:
8(844-67) 3-68-08; 8(844-67) 3-68-09; 8-995-409-61-60;
- Оперативный дежурный по МВД России по Иловлинскому р-ну
02; 8(844-67) 5-13-42
- ГБУ ВО «Иловлинская райСББЖ» 8-84467-3-68-97; 3-65-80

E-mail: ilov_vetstan@mail.ru